

AIMGA کے ساتھ بہتر زندگی گزاریں

جلد 2 : آئیے دل سے دل ملائیں



کی بیماری یا کورونری دل کی بیماری بھی کہا جاتا ہے ، سے مراد دل کی "Ischemic heart" دل کی بیماری ، جس کو شریانوں میں رکاوٹ ہے۔ دل کی شریانوں میں جو مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک کا سبب بن سکتی ہیں: دل کا دورہ، دل کی (Health Canada 2022) ناکامی، یا موت۔ دل کی بیماریاں کافی عام ہیں ، یہ کینیڈا میں موت کی دوسری بڑی وجہ ہے۔ یہ مہینہ دل کا مہینہ ہے ، جو دل کی صحت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو اور دوسروں کو تعلیم دینے کا ایک موقع ہے۔ فروری کا نیوز لیٹر اس تعلیم اور آگاہی پر توجہ مرکوز کرے گا، آپ کو آپ کے دل کی صحت کا خیال رکھنے کے لئے ضروری معلومات اور تجاویز فراہم کرنا ہے۔

آؤ شامل ہوجاؤ

- اس لنک پر جا کر ہارٹ انڈ سٹروک فاونڈیشن کے ساتھ رضاکارانہ طور پر کام کریں۔ www.heartandstroke.ca
- سینٹ جان ایمبولینس کے ساتھ رضاکارانہ طور پر کام کریں، جہاں کینیڈا بھر سے ۱۵۰۰۰ سے زائد رضاکار کام کرتے ہیں (<https://sja.ca/en>)
- کو فالو کریں #HeartMonth گفتگو میں شامل ہوں - سوشل میڈیا پر ان میں سے کچھ ذرائع کو گوگل (google) کرنے کی کوشش کریں!
- دل کے مہینے کے لئے سب کچھ - یونیورسٹی آف اوٹاوا ہارٹ انسٹی ٹیوٹ
- فروری 13 2024 سرخ کینیڈا پینین: ماہرین سے پوچھیں! آؤ مل کر، خواتین کے دل کی صحت میں رکاوٹوں پر قابو پائیں
- بیبی ہارٹس وینکوور، البرٹا بلیو کراس، سینٹر، دل کی جدت طرازی، کینیڈین خواتین، ہارٹ ہیلتھ انانس۔

خطرناک علامات!

تکلیف کو اکثر "دباؤ یا سینے کے بھاری پن" کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو سینے میں درد یا دباؤ بالکل نہیں ہوتا۔ خواتین میں اس کی مبہم علامات زیادہ پائی جاتی ہیں (مثال کے طور پر، متلی، کمر یا جبڑے کا درد)۔



Sources: American Heart Association, Mayo Clinic, Health Canada, American Heart Association

تجاویز اور وسائل



- دل کی بیماری واقعات کا ایک سلسلہ ہے، جو بہت سے خطرات کے عوامل سے شروع ہوتا ہے، جیسے موٹاپا، ذیابیطس، خون کا دباؤ۔ اگر علاج نہ کیا جائے، تو یہ فالج، دل کے دورے یا دل کی شریانوں سبب بن سکتا ہے
- کیا ہے؟ (AED) کیا آپ جانتے ہیں کہ اے ای ڈی Automated external defibrillators یہ برقی آلات ہوتے ہیں اگر کسی شخص کے دل کی دھڑکن رک گئی ہے تو اسے دوبارہ شروع کریں۔ جب دل کا دورہ پڑتا ہے تو دل کی دھڑکن کو دوبارہ صحیح کرنے کے لیے کرنٹ دینا پڑتا ہے۔ یہ طریقہ ڈیفیبریلیشن کہلاتا ہے آسانی لے جانے والی مشینیں جو کے دل کی دھڑکن کا تجزیہ کرتی ہیں (AED)، اس بات کا تعین کریں کہ آیا جھٹکے کی ضرورت ہے یا نہیں اور اس عمل کے ذریعے -بچانے والے کی رہنمائی کے لئے صوتی یا اسکرین اشارے کا استعمال کریں اے ای ڈی زندگیاں بچانے میں مدد کرسکتے ہیں۔ (AED)

دل کے دورہ کی انتہائی علامات:


۱ سینے میں درد یا تکلیف۔

۲ سر کا ہلکا ہونا، متلی، یا الٹی کرنا۔

۳ جبڑے، گردن، یا پیٹھ میں درد۔

۴ بے آرائی، کندھے یا بازو میں درد۔

۵ سانس لینے میں دشواری۔



مزید معلومات کیلئے Heart.org/HeartAttack

Source: American Heart Association, 2021

صحت کی یاد دہانیاں!



- کیا ہائی بلڈ پریشر آپکے خاندان میں موجود ہے، یا کیا آپ صرف اپنے بلڈ پریشر کی سطح کے بارے میں فکر مند ہیں؟
- اگر ہاں، تو آج بلڈ پریشر مانیٹر خریدیں اور باقاعدگی سے اپنی سطح کی نگرانی کریں۔
- اگر آپ کو پہلے دل کا دورہ پڑا ہے، تو صحت سے متعلق ضروری معلومات رکھیں تاکہ طبی عملہ ہنگامی صورتحال کی صورت میں آپ کا علاج کر سکے۔ ذاتی صحت کی معلومات ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں اور اسے کسی ایسی جگہ پر رکھیں جو ہر کسی کی دسترس میں ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ معلومات دینے کے قابل نا ہوں۔

- کیا آپ نے آج ورزش کی ہے؟
- ڈبلیو ایچ او ہر ہفتے کم از کم 150 منٹ ورزش کی سفارش کرتا ہے۔ کیوں نہ آج سے ہی متوازن غذا شروع کی جائے۔ آپکا دل آپکا شکر گزار ہوگا۔
- باقاعدگی سے معائنہ کرائیں (سال میں کم از کم ایک بار)، جو دل کی بیماریوں کی جلد تشخیص کے لئے مددگار ہوگا۔
- آج ہی اپنے بنیادی نگہداشت کے معالج سے ملاقات کا وقت بک کریں۔
- تناؤ سے چھٹکارا دل کی محبت ہے۔ روزانہ آرام کرنے کے طریقے تلاش کریں جیسے موسیقی سننا، جرنل پڑھنا، مراقبہ کرنا، یا یوگا کرنا۔
- آج ایک زندگی بچائیں۔ اپنی فرسٹ ایڈ اور بنیادی لائف سپورٹ (بی ایل ایس) کی مہارتوں کو جدید رکھیں اور ہمیشہ اپنے ارد گرد AED سے آگاہ رہیں۔ کے آپ اور یقینی بنائیں کہ یہ کام کرتا ہے۔

Sources: Health Canada, 2017; WHO, 2022; Red Cross, 2022

ہائی بلڈ پریشر جیسے طبی حالات کی ابتدائی تشخیص، اور علاج، زہنی دباؤ میں کمی، ذیابیطس اور ہائی کولیسٹرول کا علاج آپ کو دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔

12 میں سے 1 (یا 2، 6 ملین)، 20 سال سے زائد عمر کے کینیڈین افراد دل کی بیماری کی تشخیص کے ساتھ زندہ ہیں۔

دل کی بیماری مردوں اور عورتوں کو مختلف طریقے سے متاثر کرتی ہے۔

عموماً (۵۵ سے ۶۴) سال کی عمر کے مردوں میں دل کی بیماری کی تشخیص عورتوں (۵۵ سے ۷۴) کے مقابلے میں ۱۰ سال پہلے ہوتی ہے۔

خواتین کے مقابلے میں مردوں میں دل کا دورہ پڑنے کا امکان 2 گنا زیادہ ہوتا ہے

مزید معلومات کیلئے ، کا مکمل ورژن

"Living Well With AIMGA" دیکھیں۔

نیچے دیے گئے QR کوڈ کو فون سے اسکین کر کے نیوز حاصل کریں۔



<https://aimga.ca/wp-content/uploads/documents/newsletter/february/febNewsletter.pdf>



کیا آپ جانتے ہیں؟

AIMGA ماہرین اس موضوع پر آپ سے بات کرنے کے لیے دستیاب ہیں۔

مزید معلومات کے لیے ای میل کے ذریعے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں۔

drew@aimga.ca

ترجمہ کے لیے، روماسہ روماسہ ، اور عایشہ اشرف کا شکریہ