

# خود را در برابر ویروس Papillomavirus محافظت کنید!

## واکسین HPV

### این واکسین در برابر چه نوع بیماری محافظت میکند:

این (HPV-9) که می تواند باعث انواع مختلف سرطان، مانند رحم، مقعد، لث تناسلی و اکسین در برابر ۹ نوع ویروس پاپیلوم انسانی مرد، زن، سر، و سرطان گردن وغیره HPV) می تواند باعث لشدن لث تناسلی شود. علاوه بر این ( )



### چه کسانی باید این واکسین را بیگیرند:

این واکسین به عنوان بخشی از برنامه معمول واکسین به شاگردان در صنف ۶-۱۱ (۱۲ ساله) ارایه می شود.

اگر شما در صنف ۶ نتوانستید این واکسین را بیگیرید ، شما هنوز هم میتوانید این واکسین را بصورت رایگان الی ۲۶ سالگی بیگیرید.



### چه کسانی نباید این واکسین را بیگیرند:

اگر شما به هر بخشی از این واکسین حساسیت داشته باشید.

اگر شما عوارض جانبی شدید یا غیرمعمول تجربه کرده اید بعد از این واکسین ویا واکسین مشابه. اگر شما حامله هستید.

اگر شما تصمیم حامله شدن را دارید، شما باید (HPV-9) را قبل از حامله شدن دریافت کنید. تمام دوز های توصیه شده واکسین

### عوارض جانبی این واکسین چه هست:

عوارض جانبی خفیف و موقت هست و ممکن هست شامل درد در محل تزریق، تورم، خستگی، سردی، تب، درد بدن، تهوع، استفراغ، درد معده، وغیره باشد. عوارض جانبی را می توان با قرار دادن یک لباس سرد و مرطوب در محل تزریق و یا با گرفتن دواهای مانند آیپروپوفین یا استامینوفن مدیریت کرد.



تماس با خط بهداشت ۸۱۱ بیگیرید  
برای کسانیکه جدیداً امده اند با خط تلفن ۰۶۲ ۱۵۸۷۳۹۲۸۰ چندین زبانه ایمگا تماس بیگیرید  
با داکتر فامیلی تان یا شبکه مراقبت های اولیه تماس بگیرید  
برای بوک کردن یک رهنما از booking.aimga.ca باز دید کنید