

د ۴ ډوله باکټريايي انتاناتو څخه مو ساتنه کوي

د مينينگوکوکل کنجيت (A, C, Y, W-135) ډول واکسين

د **MenC-ACYW** واکسين د نيبسيريا مننژيت باکټريا د څلورو ډولونو په وړاندې ساتنه کوي، چې د مينينگوکوکل ناروغی لامل کيږي.

مننځوکوکل ناروغي کولی شي د هغه مايع او استر د خورا شديد انتان لامل شي چې دماغ او نخاع پوښوي (مننجيټس) يا د وينې جريان د انتاناتو سبب شي.

- په هرو ۵ کسانو کې چې د مينينگوکوکل ناروغي لري يو يی د شديد انتان سبب کيږي چې د کانه کيدو، قبضيت، دماغي زيان، او د لاس يا پښې د ضايع کيدو لامل کيږي.
- په هرو لسو کسانو کې چې د مينينگوکوکل ناروغي لري يو ناروغ خپل ژوند د لاسه ورکوي.

څوک بايد دا واکسين ترلاسه کړي:

دا واکسين د ښوونځيو د واکسينونو د معمول پروگرام د يوې برخې په توگه د نهم ټولگي زده کونکو (۱۴-۱۵ کلن) ته وړاندې کيږي. هغه زده کونکي چې په نهم ټولگي کې د **MenC-ACYW** واکسين ترلاسه کولو څخه محروم پاتې شوي کولی شي د ۱۲ ټولگي تر پايه پورې يی وړيا ترلاسه کړي.

تاسو بايد دا واکسين ضرور ترلاسه کړی، که تاسو د ضعيفه دفاعي سيستم له امله د مينينگوکوکل ناروغی په خطر کې ياست، د مينينگوکوکل ناروغ سره په تماس کې ياست، او يا هم بعضی د کار ډولونه.

څوک بايد دا واکسين ترلاسه نکړي؟ تاسو ممکن دا واکسين ترلاسه نه کړئ که تاسو د دې واکسين يا ورته واکسين د يوې برخې سره حساسيت يا وروسته جدي/غير معمولي جانبي عوارض يا بدې اغيزې پيدا کړي وي.

د دې واکسين جانبي عوارض څه دي؟ بدې اغيزې يی خورا عادي او لنډمهاله دي، لکه د ستنې يا پېچکاري ځای کې سوروالی، پړسوب، درد، ستړيا، سر درد، تبه، د اشتها ضعيفوالی، د زړه بدوالی يا خوا گرزېدل، کانگي، د معدې درد او داسې نور شامل دي. جانبي عوارضو د اداره کولو لپاره د د پېچکاري يا ستنې ځای کې acetaminophen يا ibuprofen يخ لوند توکر څخه کار اخيستلی شو، او د تبې يا درد سره د مقابلي لپاره د په څير درمل اخيستلی شو.



که تاسو کومي اضافي پوښتنې لرئ يا غواړئ خپل واکسين واخلئ؟ تاسو کولی شئ:

- د روغتيايي خدماتو ۸۱۱ شميري سره اړيکه ټينگه کړي.
- د نوي راغلو خلکو لپاره د څو ژبو روغتيا مرکز ته په 587-392-8062 شميري اړيکه ټينگه کړي.
- د خپل کورنی ډاکټر يا د لومړني صحي خدماتو مرکز سره اړيکه ونيسئ.