


د شری، ممپس، روبیلا په وړاندې ځان وساتئ

د MMR واکسین

دا واکسین مو د کومو ناروغیو پر وړاندې ساتنه کوي؟ دا په یو کی د درې واکسینونو ترکیب دی چې د دريو ویروسي انتاناتو، شری، ممپس او روبیلا په وړاندې ساتنه کوي.



- **شری:** (روبیولا یا سور شری یا سرخکان): د یو ویروس له امله رامینځته کیږي چې په اسانۍ سره د هوا له لارې خپرېږي کله چې یو څوک د شری ناروغی لری او توخی یا پرنجی کوي. دا د لوړې تبې، توخي، د پوزې بهېدل، د سترگو د سوروالی، سري ټاپي یی داغ لامل کیږي. جدي پېښي یی نادري دي مگر کولی شي د منځني غوړ او سپرو د انتاناتو لامل شي؛ د مغز پرسوب چې کیدای شي د جټکو، کانه کیدو، دماغي زیان او مړینې سبب شي.
- **ممپس:** د یو ویروس له امله رامینځته کیږي چې د توخي، پرنجی، یا د اخته کس د لعاب سره د تماس په واسطه (د بیلگې په توګه د بڼکلولو یا د لوبو د سامانونو د شریکولو) له لارې خپرېږي. دا د تبې، سر درد، ستاسو د ژامې په شاوخوا کې د غدو د پرسوب، د خصیو یا تخمدانونو پرسوب، او کانه کیدو لامل کیږي.
- **روبیلا (جرمن شری، له سور شري څخه توپیر لري):** د یو ویروس له امله رامینځته کیږي چې د توخي یا پرنجی په واسطه خپرېږي. دا کولی شي تبې، د ستوني درد، د غاړې د غدو پرسوب، د بندونو پرسوب پیدا کړي. په امیندواری کې روبیلا کولی شي د ماشوم د ضیاع یا معلولیت لرونکي زیرون لامل شي.

څوک باید دا واکسین ترلاسه کړي: د ۱۲ میاشتو عمر لرونکي ماشومان چې د شری، ممپس، روبیلا، او ویروسیلا (MMR-Var) ګډ واکسین نه ترلاسه کوي. هغه ماشومان چې (۶-۱۱ میاشتې) عمر لري او یو غړي ورته انتقال یا ترانسپلانت کیږي او یا د شری د ډیر خطر سره مخ دي. ځینې لویان او ماشومان پرته له دې چې د معافیت ریکارډ ولري بنایي چې دوی د شری، ممپس، یا روبیلا واکسینونو وړاندیز شوي دوزونه اخیستی.



څوک باید دا واکسین ترلاسه نکړي: تاسو ممکن د دې واکسین ترلاسه کولو توان ونلري

- که تاسو د واکسین کومې برخې سره حساسیت لرئ.
- که تاسو د دې واکسین وروسته یا ورته یو واکسین څخه شدید یا غیر معمولي جانبي عوارض یا بده اغیزه پیدا کړي وي.
- که تاسو روغتیایي ستونزې لرئ یا د معافیت سیستم مو ضعیفه وي.
- که تاسو په تیرو ۱۱ میاشتو کې د وینې محصولات ترلاسه کړي وي
- که تاسو امیندواره یاست.

د دې واکسین جانبي عوارض څه دي: جانبي عوارض یی لږ او لنډمهاله دي، مگر کولی شي د واکسین کولو څخه تر ۶ اونيو وروسته پورې څرګند شي، په جانبي عوارضو کې کېدای شي د سنتي یا پیچکاري ځای کې سوروالی، پرسوب، درد، ژړل، سټریا، خارښت، تبې، ضعیفه اشتها د شری په څېر داغونه (واړه سره بخار) یا د ویرسیلا په څېر داغونه (یو ډول رش چې سرونه یی اوبو پواسطه دک وی) . که ستاسو ماشوم د ویروسسیلا په څېر رش پیدا کړي، دا پټ وساتئ او د امیندواره میرمنو، نوي زېږیدلي ماشومانو، او د کمزوري معافیت سیستم لرونکي خلکو څخه یی لرې وساتئ. جانبي عوارضو د اداره کولو لپاره د پیچکاري ځای کې د یخ، لوند ټوکر په ایښودلو یا د تبې او درد سره د مقابلي لپاره د ibuprofen یا acetaminophen په څېر درمل کارولی شو.



که تاسو کومې اضافي پوښتنې لرئ یا غواړئ خپل واکسین واخلي؟ تاسو کولی شئ:

- د روغتیایي خدماتو ۸۱۱ شمیري سره اړیکه ټینګه کړي.
- د نوي راغلو خلکو لپاره د څو ژبو روغتیا مرکز ته په 587-392-8062 شمیري اړیکه ټینګه کړي.
- د خپل کورنۍ ډاکټر یا د لومړني صحي خدماتو مرکز سره اړیکه ونیسئ.