

خودرا در برابر سرخکان، کله چرک، سرخکان المانی و ابله مرغان محافظت کنید!

واکسین سرخکان، کله چرک، سرخکان المانی و ابله مرغان

این واکسین در برابر چه نوع بیماری محافظت میکند:

این یک واکسین ترکیبی چهار در یک است که در برابر بیماری های زیر محافظت میکند:

سرخکان توسط یک ویروس که به راحتی از طریق هوا گسترش می یابد زمانی ایجاد می شود که یک شخص سرفه یا عطسه کند. این ویروس می تواند باعث تب یا عطسه، ایشش بینی، سرخی چشم، جوش های سرخ و لکه دار شود. در موارد جدی و نادر می تواند باعث بیماری گوش میانی و شش ها، تورم مغز که ممکن است باعث تشنج، ناشوایی یا اسیب مغزی شود



کله چرک توسط یک ویروس که با سرفه، عطسه، و یا با داشتن تماس با براز گسترش می یابد ایجاد می شود (بوسیدن یا به اشتراک گذاری سامان الات بازی). علاج این ویروس می تواند تب، سردردی، تورم اطراف فک، تورم خصیه ها یا تخدمان ها، و ناشوایی باشد

سرخکان آلمانی ویروسی است که با سرفه یا عطسه انتشار پیدا میکند. این ویروس می تواند باعث تب، گلودردی، تورم گردن، جوش های سرخ و دردناک، مفاصل متورم، و بیماری خون شود. اگر مادر در دوران بارداری به این ویروس مبتلا شده باشد می تواند سبب سقط جنین، یا نقص های مادرزادی شود.

ابله مرغان ویروسی است که می تواند باعث تب و جوش خارش دار شود که بشکل دانه های پر از اب معلوم می شود. این ویروس به راحتی از طریق هوا با سرفه، عطسه، و یا لمس کردن دانه های باز گسترش می پاید.

بعد از اینکه شما به ابله مرغی مبتلا شدید، ویروس در بدن شما باقی می ماند و می تواند دوباره فعل شود و باعث دانه های دردناک شود.



چه کسانی باید این واکسین را دریافت کنند:

به عنوان بخشی از معمول واکسین، اطفال باید این واکسین را از سن ۱۲ ماهگی الى ۱۲ سالگی شروع کنند. آنها معمولاً ۲ دوز اخذ میکنند در سنین (در ۱۲ و ۱۸ ماه)

اگر انها نمی توانند الى ۱۸ ماهگی واکسین را دریافت کنند، می توانند دوز دوم را در سن ۴ سالگی دریافت کنند.

چه کسانی نباید این واکسین را دریافت کنند:

اگر طفل شما به حساسیت غیر معمول پس از این واکسین و یا یکی از اجزای آن داشته باشد، ویا مشکلات صحی داشته باشد مانند ضعیف بودن سیستم ایمنی، یا باردار بودن ممکن هست نتوانند این واکسین را دریافت کنند. با این حال، اکثر مردم واجد شرایط برای این واکسین در آلبرتا هستند.



عوارض جانبی این واکسین چه هست:

عوارض جانبی خفیف و موقتی هست اما می تواند تا ۶ هفته پس از گرفتن واکسین ظاهر شود.

عوارض جانبی ممکن است شامل سرخی، تورم، درد در محل تزریق، گریه، خستگی، تحریک پذیری، تب، اشتہای ضعیف، جوش های مانند سرخکان، یا جوش های مانند ابله مرغان باشد. اگر طفل شما دانه های مانند ابله مرغان داشته باشد، باید انرا تحت پوشش قرار دهید و طفل خود را از افراد حامله، طلف های نوزاد، و افراد با سیستم ایمنی ضعیف دور نگهدارید.

علاوه عوارض جانبی را می توان با قرار دادن یک لباس سرد و مرطوب در محل تزریق و یا با مصرف دواهای مانند ایبوپرو芬 یا استامینوفن برای مقابله با تب یا درد مدیریت کرد.

اگر شما هر گونه سوال اضافی دارید و یا می خواهید واکسین خود را بوک کنید شما می توانید:

تماس با خط بهداشت ۸۱۱ بیگیرید

برای کسانیکه جدیداً امده اند با خط تلفن ۱۵۸۷۳۹۲۸۰۶۲ چندین زبانه ایمگا تماس بیگیرید

با داکتر فامیلی تان یا شبکه مراقبت های اولیه تماس بگیرید

برای بوک کردن یک رهنمای booking.aimga.ca باز دید کنید