



د ښوونځي په عمر کې د واکسين کولو لپاره معلومات / بروشر



ولې زده کونکي واکسين کولو ته اړتيا لري؟

واکسين د بدن سره د ناروغيو پر وړاندې د مخنيوي لپاره د معافيت په رامینځته کولو کې مرسته کوي. د ماشومانو د لوييدلو سره د ماشومتوب د وخت د واکسينونو د محافظت توان کمزوری کيږي. د ښوونځي د عمر واکسينونه نورو خلکو ته د ناروغيو د خپرېدو په مخنيوي کې لوی رول لوبوي.

د ښوونځي د عمر واکسينونه کوم دي؟

هر کال د البرټا روغتيايي خدماتو اداره د عامه روغتيايي معافيت پروگرام د ۱، ۶ او ۹ ټولگيو ماشومانو لپاره د معافيت ريكارډونو باندې بياکتنه کوي ترڅو وگوري چې کوم واکسينونو سپارښتنه د دوی لپاره کيږي.

زده کونکي بايد کله واکسين شي؟
روغتيايي کارمندان د 6 کلونو څخه تر 15 کلنۍ پورې زده کونکو لپاره د مختلفو واکسينونو سپارښتنه کوي. دا واکسينونه د ناروغيو د خپرېدو مخه نيسي.

د ښوونځي د عمر لپاره وړانديز شوي واکسينونه

نهم ټولگي (۱۴-۱۵ کاله)	شپږم ټولگي (۱۱-۱۲ کاله)	ټولگي 1 (6 کاله)	واکسين	ناروغي
	✓		Hepatitis B Vaccine	د هيباتيت بي واکسين هيباتيت بي
✓			dTap Vaccine	د dTap واکسين ډيپټيريا، ټيتانوس، د سيلولر پرتوسس
✓			MenC-ACYW Vaccine	MenC-ACYW مينينگوکوک ناروغي
	✓		HPV-9 Vaccine	د HPV-9 واکسين د انسان پاپيلوما ويروس

والدين څنگه مرسته کولی شي؟

والدين کولی شي د خپلو ماشومانو سره د وړانديز شوي واکسينونو په برحاله يا اپډيټ ساتلو کې مرسته وکړي.

که تاسو کومي اضافي پوښتنې لرئ يا غواړئ خپل واکسين واخلي؟ تاسو کولی شئ:

- د روغتيايي خدماتو ۸۱۱ شميري سره اړيکه ټينگه کړي.
- د نوي راغلو خلکو لپاره د څو ژبو روغتيايي مرکز ته په 1-587-392-8062 شميري اړيکه ټينگه کړي.
- د خپل کورنۍ ډاکټر يا د لومړني صحي خدماتو مرکز سره اړيکه ونيسئ.



ايا دا واکسين خوندي او اغيزمن دي؟

ټول واکسينونه په کاناډا کې خوندي او اغيزمن دي. زده کونکي ممکن عادي او لنډمهاله جانبي عوارض تجربه کړي لکه د سنتی يا پيچکاري ځای کې سوروالی، برسوب، درد، ستړيا، سر درد، تبه، د اشتها ضعيفوالی، د زړه بدوالی يا خوا گرزیدل، کانگي، د معدې درد او داسې نور شامل دي. جانبي عوارضو د اداره کولو لپاره د پيچکاري يا سنتی ځای کې د يخ لوند ټوکر څخه کار اخيستلی شو، او د تبې يا درد سره د مقابلي لپاره د ibuprofen يا acetaminophen په څير درملو اخيستلی شو.